

A avaliação de sua saúde geral é de responsabilidade de seu médico (Clínico Geral), seria bom consultá-lo. É indispensável que você goze de boa saúde, para realizar um tratamento odontológico. Os controles da pressão arterial, glicose e do colesterol, são importantes. Caso houver alguma alteração recente em sua saúde preencha novamente o questionário de saúde para tomarmos os cuidados necessários.

Algumas doenças ósseas podem ser tratadas com um grupo de medicamentos chamados **bifosfonatos**. Estes medicamentos são indicados para retardar o envolvimento ósseo em algumas doenças. Mesmo já tendo interrompido o uso destes medicamentos por longo tempo, precisamos ser informados. Quem toma ou tomou **bifosfonados** pode ter complicações nas cirurgias da boca.

Os remédios que você toma normalmente (para controle de pressão, diabete, hormônio, etc...) não devem ser interrompidos. **O médico responsável por medicação anticoagulante poderá suspender o uso por alguns dias.**

Anticoagulantes: Ácido Acetil Salicílico (AAS, Aspirina, Sonrisal, Melhoral, etc...), Varfarina, Coumadin®, Marevan®, são medicamentos prescritos com bastante frequência na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. Estes medicamentos **não devem** ser suspensos antes do procedimento cirúrgico, a não ser que seja orientado para isso. Se necessário, o médico responsável pela medicação anticoagulante deverá ser consultado.

Importante: Se tomar Gincobiloba, suspenda o uso por pelo ,menos 1 semana

No dia da cirurgia, não coma nem a mais nem a menos do que esteja acostumado. Faça sua alimentação "normal". Para o pós-operatório programe uma alimentação preferencialmente líquida / pastosa: sopas, vitaminas, sucos, purês e massas.

Pré - Medicação - Esteja atento a necessidade de tomar medicações antes de procedimentos cirúrgicos, caso tenha sido receitada. Verifique com cuidado as datas, horários e dosagem dos medicamentos.

Para pacientes que farão Procedimentos com SEDAÇÃO

1. Venha acompanhado de um adulto.
2. Jejum de 6 horas para alimentação em geral e 3 horas para água e líquidos claros (leite não pode).
3. Para pacientes com redução de estômago, seja por cirurgia bariátrica ou balão intra-gástrico, diabéticos, obesos, com hérnia de hiato ou refluxo, o jejum é de 8 horas para alimentação em geral e 4 horas para líquidos claros.
4. Todas as medicações de uso regular deverão ser usadas na manhã do procedimento com o mínimo de água, inclusive a medicação prescrita pelo Dentista Responsável. Atenção: Medicação para diabetes orais não devem ser usados, quem usa insulina deve fazer a metade da dose habitual da manhã.
- 5 - Venha de blusa com abertura na frente, com botões, mangas curtas, largas e sapato baixo.
- 6 - Trazer os exames de sangue e cardiológicos mais recentes.

Em caso de duvida contactar Dra. Andréa Peixoto (Anestesiologista) - Tel: 21 999642264