

Informações Pré Operatórias CG



Para que tudo corra bem em seu procedimentos siga as orientações abaixo, se houver dúvidas por favor entre em contato conosco.

É importante que esteja se sentindo bem, qualquer desconforto, febre, dor abdominal e etc... devem ser relatados.

Os remédios que você toma normalmente (para controle de pressão, diabete, hormônio, etc...) não devem ser interrompidos. **O médico responsável por medicação anticoagulante poderá suspender o uso por alguns dias.**

Anticoagulantes e Antiagregantes Plaquetários: Ácido Acetil Salicílico (AAS, Aspirina, Sonrisal, Melhoral, etc...), Varfarina, Coumadin®, Marevan®, são medicamentos prescritos com bastante frequência na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. Estes medicamentos **não devem** ser suspensos antes do procedimento cirúrgico, a não ser que seja orientado para isso. Se necessário, o médico responsável pela medicação anticoagulante deverá ser consultado.

No dia da cirurgia, não coma nem a mais nem a menos do que esteja acostumado. Faça sua alimentação "normal". Para o pós-operatório programe uma alimentação preferencialmente líquida / pastosa: sopas, vitaminas, sucos, purês e massas.

Esteja atento a necessidade de tomar medicações antes de procedimentos cirúrgicos, caso tenha sido receitada. Verifique com cuidado as datas, horários e dosagem dos medicamentos.

Assista o vídeo de informações pós operatórias para ter uma ideia de quais as necessidades para sua melhor recuperação.

Muito Importante para a Sedação:

1. Se tomar Gincobiloba, Ozempic ou similares suspenda o uso por pelo menos 10 dias.
2. Venha acompanhado de um adulto.
3. Jejum de 6 horas para alimentação em geral e 3 horas para água e líquidos claros (leite não pode).
4. Para pacientes com redução de estomago, seja por cirurgia bariátrica ou balão intra-gástrico, diabéticos, obesos, com hérnia de hiato ou refluxo, o jejum é de 8 horas para alimentação em geral e 4 horas para líquidos claros.
5. Todas as medicações de uso regular deverão ser usadas na manhã do procedimento com o mínimo de água, inclusive a medicação prescrita pelo Dentista Responsável. Atenção: Medicação para diabetes orais não devem ser usados, quem usa insulina deve fazer a metade da dose habitual da manhã.
6. Venha de blusa com abertura na frente, com botões, mangas curtas, largas e sapato baixo.
7. Trazer os exames de sangue e cardiológicos mais recentes.

Este informativo tem a simples finalidade de melhorar nossa comunicação, no entanto, se houver alguma dúvida, entre em contato que teremos o maior prazer em atender você.